AVERTISSEMENTS

DLP 10 - 4 - 69 913395

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE: 25 april 19

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, Route de Seurre -21 BEAUNE - Tél. 5.17

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-ET-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Regisseur de receites de la Direction Départementale de l'Agriculture : C.C.E. DIJON 3465.32 X

Supplément au Bulletin nº 103 - AVRIL 1969

Hesures préconisées pour généraliser les préceutions à prendre lors de l'utilisation des hormones herbicides et des hormones débroussaillantes en vue d'éviter les dégâts aux cultures voisines.

Les mentions suivantes devront être indiquées par les fabricants : sur les étiquettes : (La mention suivante devra être indiquée en caractères très apparents). Attention, danger pour les cultures voisines. Respectez strictement le mode d'emploi.

sur les notices : 1º) Cas des hormones herbicides :

Sous l'influence de certains facteurs (situation, vent, température; etc...), les hormones herbicides risquent de provoquer au voisinage de la zone d'application du traitement des dégâts sur les cultures sensibles (vigne, arbres fruitiers, cultures légurières et ornementales, pépinières, lin, colza, tournesol, tabac, légumineuses, pommes de terre de plents, etc...).

Il faut donc éviter l'entraînement du produit, en prenant les précautions suivantes : - employer un appareil à pression de liquide à jet projeté, réglé pour épandre plus de 400 litres de bouillie à l'hectare avec une pression inférieure à 4 kg et des pastilles à large orifice.

- Préférer le jet plat aux autres formes de jets.

- Régler la hauteur de la rampe le plus près possible de la position assurant une pulvérisation régulière sur la culture.

- - Ne traiter que par temps calme, sans vent, de préférence à une température inférieure à 20° à l'ombre et, en aucun cas, au delà d'une température de 25° à l'ombre.

Toutes ces précautions devront être d'autant plus soigneusement respectées que la culture sensible sera proche de la culture traitée et de l'axe des vents dominants à l'époque du traitement.

Il convient par ailleurs de nettoyer très soigneusement et de rincer les pulvérisateurs aussitôt après le traitement. Dans toute la mesure du possible, il est préférable de réserver un appareil uniquement pour les traitements de désherbage.

2°) Cas des hormones débroussaillentes :

Sous l'influence de certains facteurs (situation, vent, température, etc...), les hormones débroussaillantes risquent de provoquer dans la zone d'application du traitement des dégâts sur les cultures sensibles (vigne, arbres fruitiers, cultures légumières etc...). Il convient donc de ne pas traiter à proximité de ces cultures.

Il convient par ailleurs de nettoyer très soigneusement et de rincer les pulvérisateurs aussitôt après le traitement. Dans toute la mesure du possible, il est préférable de réserver un appareil uniquement pour les traitements de désherbage.

Les Ingénieurs-Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie - Inspecteur de la Protection des Végétaux - Circonscription Phytosanitaire "Bourgogne et Franche-Comté"

H. SOULIE Imprimerie de la Station "Bourgogne & Franche-Comté"